



CHLORHEXAMED® SORTIMENTS- ÜBERSICHT



DAS MAGAZIN FÜR DIE PROPHYLAXEASSISTENTIN



	MUNDSPÜL-LÖSUNGEN				SPRAY	GEL	DENTALLÖSUNG
Ziel	Zur Pflege und Unterstützung der täglichen Mundhygiene	Zur Behandlung von Zahnfleischentzündungen			Zur Keimzahlreduktion der schwer zu erreichenden Bereiche im tiefen Mundraum	Zur unterstützenden Behandlung bei Zahnfleischentzündungen	Zur Behandlung von Zahnfleischentzündungen
Produkt	Chlorhexamed® Zahnfleisch-Schutz Mundspül-Lösung	Chlorhexamed® Fluid 0,1% – orale Spüllösung	Chlorhexamed® Forte 0,2% – orale Spüllösung	Chlorhexamed® Forte alkoholfrei 2mg/ml	Chlorhexamed® Forte 0,2% – orale Spüllösung	Chlorhexamed® 1%-GEL	Chlorhexamed® Forte 2mg/ml Dentallösung
Konzentration	0,06% Chlorhexidindigluconat + 250 ppm Fluorid	0,1% Chlorhexidindigluconat	0,2% Chlorhexidindigluconat	0,2% Chlorhexidindigluconat	0,2% Chlorhexidindigluconat	1% Chlorhexidindigluconat	0,2% Chlorhexidindigluconat
Inhalt	300 ml	200 ml	200 ml	200 ml	50 ml	50 g	600 ml
Dosierung	1-2x täglich 10 ml	2x täglich 15 ml	2x täglich 10 ml	2x täglich 10 ml	2x täglich 12 Sprühstöße	2 bis 3 mal täglich wie Zahncreme mit der Zahnbürste einbürsten oder direkt mit Wattestäbchen	10 ml vor jeder Behandlung
Anwendungsdauer	längerfristig ¹	max. 3 Wochen	3 Wochen	3 Wochen	3 Wochen	1 Monat	auch über einen längeren Zeitraum
Status	Kosmetikum	Arzneimittel	Arzneimittel	Arzneimittel	Arzneimittel	Arzneimittel	Dentalarzneimittel
AVP² (inkl. MwSt.)	EUR 5,50 ³	EUR 8,75	EUR 9,45	EUR 9,90	EUR 9,90	EUR 9,90	EUR 19,80
Zielgruppe	Zur Pflege und Vorbeugung von Zahn- und Zahnfleischerkrankungen bei Personen mit erhöhtem Risiko: <ul style="list-style-type: none"> Diabetiker Bei medikamentenbedingter Mundtrockenheit Eingeschränkte manuelle Mundhygiene Schwangere Raucher 	Für Patienten <ul style="list-style-type: none"> mit einfachen bis eitrigen Gingivitiden zur Behandlung oder Vorbeugung infektiös bedingter Parodontopathien bei Tonsillitis, Angina, Seitenstrangangina, Pharyngitis bei Verletzungen sowie vor und nach operativen Eingriffen im Mund- und Rachenraum (z.B. vor parodontalchirurgischen Eingriffen) bei Aphthen und Mundschleimhautentzündungen wie Stomatitis (insbesondere unter Prothesen) zur Beseitigung von Foetor ex ore, wenn eine normale Mundhygiene nicht möglich ist zur Mundhygiene, wenn eine normale Mundhygiene (Zahnputzen) nicht möglich ist für die Vorbeugung, aber auch zur Entfernung von Zahnplaque 					

¹ bei längerer Anwendung kann es zu leichten Verfärbungen kommen
² Apothekenverkaufspreis
³ unverbindlich empfohlener Endverbraucherpreis